スズメバチに



繁殖期の夏から秋はスズメバチの活動が活発になる季節で する恐れもあり、全国で毎年30人もの命が奪われてい するスズメバチの一番の恐怖は長く鋭い毒針です。 い工夫をしましょう。 大群になります。 づくりを開始。8月から9月ころには、 特にアレルギーを持つ人の場合は、 スズメバチの習性を知り、 巣づくりが始まると住宅地や林の中で急増 安全対策を図り被害に遭わな 刺されるとショック 5 000匹ほどの ます。 死

スズメバチは、

5月から7月にかけて1匹の女王バチが巣

近にいる危険な野 物は何か? 生動

他のハチ

るのではないでしょうか。 とスズメバチと答える人も かの名前が浮かぶと思います。 毒へビのハブ…など、いくつ ているということを考慮する H 平成16年度の北海道の集計 毎年30人もの人命が奪われ は?」という問いにヒグマ、 本で最も恐ろし 7 野 7生動 41

スズメバチ

あり、 では、 されています。 のスズメバチに関する相談が 全道で15、 251件の被害が報告 9 1 7 件

として第一位に選ばれるかも メバチが、 生活圏内にも生息するスズ 全国規模で考えた時、 わが国の 危険動物 人間

スズメバチやミツバチは

ふらふらゆっ 直線的にすば くり飛ぶ (Ξ) 飛び方 ツバチ、 やく飛ぶ アシ ナガバチ等) 胸部と腹部の 腹部がゆるや 形 くびれがはっ か (アシナガ 体 バチ等) きりしている 出入口が複数 出入口が1つ

تع 険なの? うしてスズメバチが

危

る時に、 力な針で外敵を刺し、 社会生活をします。 ハチは、 スズメバチは自分や巣を守 腹部の先端にある強 女王バチを中心に 毒液を

> ハチの巣 黒い服装は避け、 ます。それは巣を 黒い帽子も禁物で いわれています。 する防衛行動だと よく襲うクマに対 フェロモンにコン 場所に行く時は ハチがいそうな また、 ハチは

活する昆虫。 が含まれているものもあるの 中にはハチを興奮させる物質 トロールされて生 香水や整髪料の

回ったり追い払おうと手を振 化粧品の使用は控えましょう。 回しがちですが、 チが 飛んでくると逃 それはハ

n

あります。 最悪の場合、 うアレルギー症状を起して、 フィラキシーショック」とい 反 応の一 刺 された人は、 種である「アナ 死亡することが 抗原抗

体 注

ズメバチから身を守る

ずにハチを刺激したためです。 聞きますが、その習性を知ら 動かないものを敵と認識しな に襲われたというニュースを チを興奮させる行為です。 いのでじっとして、ハチが 遠足で小学生がスズメバ

策として有効な手段です。 勢を低くすると人間を見失い 飛び去ることが多く、ハチ対

くて動くものに攻

黒

処といわれています。 び去るのを待つのが正し

7

対 飛

ハチが襲ってきた時に、

姿

撃する習性があり

は :: ハチに刺され た 時

出しながら、 指で強くつまんで、 い流します。 があるので、 やかに取り除くことです。 まず、 ハチの毒は水に溶ける性 注入され 刺された部分を きれいな水で洗 た毒 毒を絞り 液 を 質 速

うにしましょう。 ステロイド軟膏が用いられて うのはまったくの迷信です。 病院で検査や治療を受けるよ います。 薬は抗ヒスタミン剤を含む 患部にアンモニアをかける ハチの毒を中和 応急処置が済んだら するとい

で、

自然の中に入る時には、

チ